





Press Esc to exit full screen

ΕΡΠΗΣ ΖΩΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ-ΑΝΑΓΚΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΒΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

29ο Ετήσιο Σεμινάριο Σ.Ι.Ε.

Τότοκας Χαρής Παθολόγος/ Λοιμωξιολόγος Μονάδα Λοιμωξεων- Ε Παθολογική κλινική ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»

Χ. Τότοκας

Sponsored by GSK

29ο Ετήσιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Νοσοκομείων «Ο Ευαγγελισμός»

Ιός ανεμευλογιάς- έρπητα ζωστήρα (VZV)

• (HHV-3)

• σφαιρική διαμόρφωση

• ~80-120 nm διάμετρο

• Φάκελλος (λιπιδικό στρώμα) + Τουλάχιστον 9 γλυκοπρωτεΐνες (gE, gB, gH, gI, gL)

• Περιβάλλεται από άμορφο πρωτεϊνικό στρώμα

• Το DNA περιβάλλεται από εικοσαεδρο πρωτεϊνικό καψίδιο

Χ. Τότοκας

Sponsored by GSK

29ο Ετήσιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Νοσοκομείων «Ο Ευαγγελισμός»

Ο έρπητα ζωστήρας προκαλεί καυστικό και διαφιφιστικό άλγος¹

Επίπεδο πόνου που αναφέρεται για διαφορετικές καταστάσεις χαρακτηριστικές το αναπνευστικό Εμπνευστικό Πόνου (RZP)²

Καταστάσεις ήπιος πόνος

Καταστάσεις χρόνιας πόνος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΞΕΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΡΟΠΕΡΙΑΣ ΣΩΜΑΤ³

Χ. Τότοκας

Sponsored by GSK

29ο Ετήσιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Νοσοκομείων «Ο Ευαγγελισμός»

Άλλοι παράγοντες που αυξάνουν στους ασθενείς το ρίσκο εμφάνισης Έρπητα Ζωστήρα⁴

Συγκεντρωτική ανάλυση παραγόντων κινδύνου για εμφάνιση ΗΖ (αριθμός μελετών που συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση)^{1,2}

Χ. Τότοκας

Sponsored by GSK

29ο Ετήσιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Νοσοκομείων «Ο Ευαγγελισμός»

Διαθέσιμες επιλογές πρόληψης έρπητα ζωστήρα

Ανασυνδυασμένο εμβόλιο (RZV)

• Έλαβε όδση κυκλοφορίας από τον FDA το 2017¹ και από τον EMA το 2018²

• Ενδείκνυται για την πρόληψη του έρπητα ζωστήρα (ΗΖ) και της μεμερητηκής νευραλγίας (PHN), σε:

- ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω,
- ενήλικες ηλικίας 18 ετών και άνω που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ΗΖ³

• Συμπεριλαμβάνεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2024

Χ. Τότοκας

Sponsored by GSK

29ο Ετήσιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Νοσοκομείων «Ο Ευαγγελισμός»

Θεματικές Ενότητες

- Έρπητα ζωστήρας – επίπτωση στη ζωή των ασθενών, παράγοντες κινδύνου – θεραπευτικές επιλογές
- Διαθέσιμες επιλογές πρόληψης
- Ανασυνδυασμένο εμβόλιο RZV
 - Σχεδιασμός
 - Κλινικά δεδομένα σε ανοσοκαταπιεστικούς ενήλικες
 - Κλινικά δεδομένα σε ηλικιωμένους ηλικιωμένους
 - Ελλειμνη φαρμακο-οικονομική δεικνισια
 - Συμπεριληψη & θεολογική στήριξη
 - Σκεπτικές (αργωτικές & δικαστικές)
- Σύνοψη

Χ. Τότοκας

Sponsored by GSK

29ο Ετήσιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Νοσοκομείων «Ο Ευαγγελισμός»

Το RZV μελετήθηκε διεξοδικά σε 2 μεγάλες φάσης III κλινικές μελέτες¹⁻³

Σχεδιασμός και στόχοι μελέτης	ZOE-50 ^{1,2} (Zoster-005)	ZOE-70 ³ (Zoster-023)
Σχεδιασμός	Τυχαιοποιημένη, τυφή ως προς τον παρατηρητή, ελεγχόμενη με στενωκό φάρμακο, πολυκεντρική, πολυθνηκή μελέτη (όδση Αμερική, Ευρώπη, Ασιατική Αμερική, Ασία-Ευρώπη)	
Πρωτεύον στόχος	Αποσκευαστικότητα κατά του ΗΖ σε όσημα >50 ετών	Αποσκευαστικότητα κατά του ΗΖ σε όσημα >70 ετών
Δοσολογικό σήμα	Εμβόλιο Η εικονικό φάρμακο χορηγούμενο (0,5 mL) ενδομυϊκό στους 0 και 2 μήνες	
Πρωτεύοντες όσημα στη συγκριτική ανάλυση	Αποσκευαστικότητα κατά της PHN σε όσημα >70 ετών	Αποσκευαστικότητα κατά του ΗΖ σε όσημα >70 ετών
Αριθμοί φεμετιζάντων	Εντέθηκαν 16.160 όσημα	Εντέθηκαν 14.816 όσημα

Χ. Τότοκας

Sponsored by GSK

29ο Ετήσιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Νοσοκομείων «Ο Ευαγγελισμός»

Το RZV παρέχει >90% αποτελεσματικότητα έναντι έρπητα ζωστήρα σε ενήλικες ≥50 ετών¹⁻³

Ηλικιακή ομάδα (έτη)	ZOE-50 ^{1,2}	Ηλικιακή ομάδα (έτη)	ZOE-50 και ZOE-70 ^{1,2} Προσθετωμένης αποτελεσματικότητας ανάλυση
≥50	97,2% (95,1-99,3)	≥70 ³	91,3% (89,2-93,4)
50-59	96,6% (94,5-98,7)	70-79	91,3% (89,2-93,4)
60-69	97,4% (95,3-99,5)	≥80	91,4% (89,3-93,5)
≥70	97,9% (95,8-100)		

Χ. Τότοκας

Sponsored by GSK

29ο Ετήσιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Νοσοκομείων «Ο Ευαγγελισμός»

