



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ



European
Reference
Network

Endo-ERN
Member

Γ.Ν.Α ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

**ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
«ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΚΚΟΣ»
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ**

**ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΜΩΜΟΣΥΝΗΣ
ΣΠΑΝΙΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ**

Υψηλάντου 45 – 47
Αθήνα Τ.Κ 106 76

endo.evangelismos@gmail.com

ΤΗΛ: +302132041825
+302132041827
ΤΗΛ/ΦΑΧ: +302132041828

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Θ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ

Χρήσιμες πληροφορίες για τη λήψη αναστολέων SGLT2

- Οι αναστολείς του συμμεταφορέα SGLT2 (dapaglifozin, empaglifozin, canaglifozin) είναι ένα είδος αντιδιαβητικής αγωγής
- Τα φάρμακα αυτά δρουν στους νεφρούς αποβάλλοντας την περίσσεια της γλυκόζης μέσω των ούρων
- Χορηγούνται μόνο τους ή σε συνδυασμό με άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα
- Παραδείγματα εμπορικών ονομασιών Forxiga, Xigduo, Synjardy, Jardiance, Invokana, Glyxambi

Οφέλη	Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Μείωση τιμών σακχάρου	Λοιμώξεις ουρογεννητικού συστήματος
Απώλεια βάρους	Ναυτία / δυσκοιλιότητα
Καρδιο-νεφρο προστασία	Υπόταση /αφυδάτωση
Βελτίωση αρτηριακής πίεσης	Κετοξέωση **

**** Η κετοξέωση είναι κρίσιμη κατάσταση και απαιτεί άμεση ιατρική αντιμετώπιση. Συμβαίνει όταν αυξάνονται τα επίπεδα οξέος στο αίμα.**

Εάν εμφανίσετε οποιοδήποτε από τα εξής συμπτώματα ζητήστε ιατρική βοήθεια άμεσα.

- >ναυτία
- >έμετος
- >κοιλιακό άλγος
- >ταχύπνοια
- >ζάλη
- >πολυδιψία

Είναι πο πιθανό να συμβεί σε καταστάσεις ασθένειας, λοίμωξης ή χειρουργείου.

3 μέρες πριν από οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση

Για την πρόληψη της Διαβητικής Κετοξέωσης σε ασθενείς που λαμβάνουν αναστολείς SGLT2 **διακόπτουμε τη λήψη τους :**

Σε καταστάσεις αδυναμίας λήψης τροφής και υγρών π.χ. έμετοι

Σε ανεπαρκή λήψη υδατανθράκων (ψωμί, πατατες, μακαρόνια, γλυκά)

Κατά τη διάρκεια λοίμωξης

Ενημερώνετε πάντοτε τους γιατρούς σας για τη λήψη αναστολέα SGLT2. Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε να μετρηθούν τα επίπεδα σακχάρου και κετόνης στο αίμα. Πριν την επανέναρξη του φαρμάκου συμβουλευτείτε το γιατρό σας.